

CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA (Bluetongue)

ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA

CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA (Bluetongue) jest chorobą zwierząt przeżuwających, zarówno domowych jak i dzikich wywołaną przez wirusy. Choruje bydło, owce i kozy, ale także sarny, jelenie, afrykańskie antylopy czy wielbłądy.

Zwierzęta nie zarażają się bezpośrednio od siebie, a jedynie poprzez owady kłująco – ssące z rodzaju *Culicoides* (rodzina: kuczmany) oraz poprzez krew lub nasienie.

Choroba nie przenosi się na inne gatunki zwierząt gospodarskich i domowych oraz na ludzi.

† **Oznacza to, że mięso, mleko, skóry i wełna oraz inne produkty pochodzące od przeżuwaczy nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi** †

Choroba podlega obowiązkowi zwalczania na terenie RP !!!

Objawy u bydła:

U bydła częstość zachorowań jest wyższa niż u owiec, choć zwykle nie obserwuje się tak wyraźnych objawów klinicznych choroby. Na zakażenie wirusem wrażliwe są płody, szczególnie w fazie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Stąd w wyniku zakażenia dochodzi do wodogłowia płodu i deformacji wrodzonych.

Bydło po przechorowaniu może stać się nosicielem, co prowadzi do zakażenia kuczmanów i przeniesienia choroby za ich pośrednictwem na zwierzęta zdrowe.

Objawy kliniczne u krów dorosłych mogą nie być widoczne nawet do 60-80 dnia po zakażeniu. Jednakże jeśli wystąpią, można zaobserwować:

- gorączkę,
- zapalenie mięśni,
- ślinienie,
- zaczerwienienie, przekrwienie i obrzęk błony śluzowej jamy ustnej oraz innych eksponowanych nabłonków, głównie strzyków,
- owrzodzenie opuszki zębowej i niekiedy końca języka;
- zapalenie koronki i tworzywa racic;
- u krów mlecznych – huszczenie się naskórka strzyków wraz z tworzeniem się strupów,
- niepłodność i ronienia, rodzenie zdeformowanych i słabych cieląt.

Objawy u owiec:

- posmutnienie, depresja,
- gorączka powyżej 41 C,
- stan zapalny jamy ustnej, któremu towarzyszy obfite ślinienie,
- obrzęk głowy, w szczególności warg i języka,
- przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej,
- sinica warg i języka,
- owrzodzenie warg, opuszki zębowej oraz w niektórych przypadkach języka;
- obrzęki, skrećanie głowy i wymioty,
- zapalenie koronki i tworzywa racic powodujące kulawiznę, sztywny chód i zżucie puszek racicowej,
- u zakażonych samic ciężarnych może dochodzić do poronień lub rodzenia zdeformowanych jagniąt.

Główny Lekarz Weterynarii zaleca hodowcom przeżuwaczy:

- **wystrzegać się zakupu zwierząt do własnej hodowli pochodzących z niewiadomego źródła,**
- **zapewnić okresowe wizyty lekarza weterynarii w gospodarstwie**
- **jak najszybciej zgłaszać lekarzowi weterynarii wszelkie podejrzane objawy kliniczne oraz „nienormalne” zachowanie się zwierząt,**
- **zwalczać owady w pomieszczeniach inwentarskich, w których przebywają zwierzęta.**

Więcej informacji na stronie <https://www.wetgiw.gov.pl>

Informacje o artykule

Autor:

Zredagował(a): Mirosław Czysz

Data powstania: 01.10.2024 16:02

Data ostatniej modyfikacji:

Liczba wyświetleń: 347

Wydrukowano z serwisu: www.piotrkowkujawski.pl

Wydrukowano dnia: 2025-03-28 06:34:37